JAVANEH KHORASAN CO.

شرکت
جوانه خراسان

بهترین ها را از ما بخواهید...

بایندومکس®

فراتر از یک جاذب

Fungal strain

grain

Silo

corn

silage

cotton

شرایط انبارداری که منجر به رشد قارچها و تولید سموم قارچی در خوراک می‌شوند:

- دمای بالای ۱۱ درجه سانتیگراد
- رطوبت هوا بالای ۷۰ درصد
- رطوبت بالاتر از ۱۴ درصد
- درجه اکسیژن بیش از ۰/۵ درصد
- ماندگاری زیاد خوراک در انبارها

آغازه سموم قارچی اصلی در خوراک

	سویه قارچ	مایکوتوکسین
مزرعه	Fusarium	Deoxynivalenol T-2 Zearalenone Fumonisin
	Claviceps	Ergot
انبار ذخیره مواد	Aspergillus	Aflatoxin Ochrato-
	Penecillium	Ochratoxin Citrinin

بیشینه سطح قابل تحمل سموم قارچی در خوراک کامل برای حیوانات

مایکوتوکسین	گونه حیوان	دُز قابل تحمل (ppb)
آفلاتوکسین B1 (AFB1)	طیور	۲۰
	گاو شیری	۵
	نشخوارکنندگان	۲۰
	حیوانات جوان	۱۰
داکسی نیوالنول (DON)	گوساله ها	۲۰۰۰
زیرالنون (ZEA)	نشخوارکنندگان	۵۰۰
اکراتوکسین A (AOTA)	طیور	۱۰۰
فومونایسین (FUM B1+ B2)	طیور	۲۰۰۰۰
	گاو شیری	۲۰۰۰۰
	نشخوارکنندگان	۵۰۰۰۰
	حیوانات جوان	۱۰۰۰۰
T-۲ توکسین (T-2 Toxin)	همه گونه ها	۲۵۰

JAVANEH KHORASAN CO.

Ask us for the best

Bindomax

beyond an adsorbent

بایندومکس®

ترکیبی از اجزائی است که به دقت انتخاب شده اند تا حیوانات را از آثار نامطلوب سموم قارچی محافظت کنند.

آلومینوسیلیکات ویژه

(جذب فیزیکی سموم قطبی)

کربن فعال:

با بالاترین عدد یدی

(جذب سطحی مستقیم سموم قطبی)

آثار مخرب گونه‌های مختلف سموم قارچی

JAVANEH KHORASAN CO.
شرکت
جوانه خراسان
بهترین ها را از ما بخواهید...

بایندومکس Pro®

فراتر از یک جاذب

با مجوز رسمی از سازمان دامپزشکی کشور

ساز و کارهایی که بایندومکس از طریق آن‌ها سبب کاهش آثار نامطلوب سموم قارچی می‌شود:

۱. جذب سموم قطبی (محلول در آب) و غیر قطبی
۲. کنترل و حمایت از عملکرد کبد و کلیه
۳. کاهش آسیب اکسیداتیو
۴. کاهش انتشار سیستماتیک توکسین‌ها

توصیه مصرف

گاو شیری	گوساله	۵ گرم به ازای هر رأس در روز
	تلیسه	۱۵-۱۰ گرم به ازای هر رأس در روز
	دوره ی انتقال/اوایل دوره ی شیرواری	۴۰-۲۰ گرم به ازای هر رأس در روز
	اواسط دوره ی شیرواری	۳۰-۱۵ گرم به ازای هر رأس در روز
گاو گوشتی	۲۰-۵ گرم به ازای هر رأس در روز	
گوسفند و بز	۵-۳ گرم به ازای هر رأس در روز	
طیور	پیشگیری	۱-۰/۵ کیلوگرم در هر تن خوراک
	آلودگی کم تا متوسط به سموم	۲/۵-۱/۵ کیلوگرم در هر تن خوراک
	آلودگی شدید به سموم	۳ کیلوگرم در هر تن خوراک
آبزیان	۲/۵-۰/۵ کیلوگرم در هر تن خوراک	
اسب	کره اسب	۵ گرم به ازای هر رأس در روز
	مادیان، سیلمی و اسب مسابقه	۲۰-۱۵ گرم به ازای هر رأس در روز

راه‌های ارتباطی:
دفتر مشهد: ۰۵۱-۳۶۵۸۴۰۷۰
دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۹۹۵۷۴۱
دفتر آمل: ۰۱۱-۴۳۲۷۰۴۱۷
WWW.JAVANEHKHORASAN.COM
INFO@JAVANEHKHORASAN.COM
Javanehkhorasan.co