JAVANEH KHORASAN CO.

شرکت
جوانه خراسان

بهترین ها را از ما بخواهید...

بایندومکس®

فراتر از یک جاذب

Fungal strain

grain

Silo

corn

silage

cotton

شرایط انبارداری که منجر به رشد قارچها و تولید سموم قارچی در خوراک می‌شوند:

- دمای بالای ۱۱ درجه سانتیگراد
- رطوبت هوا بالای ۷۰ درصد
- رطوبت بالاتر از ۱۴ درصد
- درجه اکسیژن بیش از ۰/۵ درصد
- ماندگاری زیاد خوراک در انبارها

آغازه سموم قارچی اصلی در خوراک

	سویه قارچ	مایکوتوکسین
مزرعه	Fusarium	Deoxynivalenol T-2 Zearalenone Fumonisin
مزرعه	Claviceps	Ergot
انبار ذخیره مواد	Aspergillus	Aflatoxin Ochrato-
انبار ذخیره مواد	Penecillium	Ochratoxin Citrinin

بیشینه سطح قابل تحمل سموم قارچی در خوراک کامل برای حیوانات

مایکوتوکسین	گونه حیوان	دُز قابل تحمل (ppb)
آفلاتوکسین B1 (AFB1)	طیور	۲۰
	گاو شیری	۵
	نشخوارکنندگان	۲۰
	حیوانات جوان	۱۰
داکسی نیوالنول (DON)	گوساله ها	۲۰۰۰
زیرالنون (ZEA)	نشخوارکنندگان	۵۰۰
اکراتوکسین A (AOTA)	طیور	۱۰۰
فومونایسین (FUM B1+ B2)	طیور	۲۰۰۰۰
	گاو شیری	۲۰۰۰۰
	نشخوارکنندگان	۵۰۰۰۰
	حیوانات جوان	۱۰۰۰۰
T-2 توکسین (T-2 Toxin)	همه گونه ها	۲۵۰



JAVANEH KHORASAN CO.

Ask us for the best

Bindomax

beyond an adsorbent

بایندومکس®

ترکیبی از اجزائی است که به دقت انتخاب شده اند تا حیوانات را از آثار نامطلوب سموم قارچی محافظت کنند.

۱ **آلومینوسیلیکات ویژه**
(جذب فیزیکی سموم قطبی)

۲ **دیواره سلولی مخمر ساکارومایسز سرویسیا خالص سازی شده**
(جذب فیزیکی سموم قطبی و غیرقطبی)

۳ **کربن فعال:**
با بالاترین عدد یدی
(جذب سطحی مستقیم سموم قطبی)

آثار مخرب گونه‌های مختلف سموم قارچی

بایندومکس Pro®

فراتر از یک جاذب

با مجوز رسمی از سازمان دامپزشکی کشور

شرکت جوانه خراسان

بهترین ها را از ما بخواهید...

ساز و کارهایی که بایندومکس از طریق آن‌ها سبب کاهش آثار نامطلوب سموم قارچی می‌شود:

۱. جذب سموم قطبی (محلول در آب) و غیر قطبی
۲. کنترل و حمایت از عملکرد کبد و کلیه
۳. کاهش آسیب اکسیداتیو
۴. کاهش انتشار سیستماتیک توکسین‌ها

توصیه مصرف

گاو شیری	گوساله	۵ گرم به ازای هر رأس در روز
	تلیسه	۱۵-۱۰ گرم به ازای هر رأس در روز
	دوره ی انتقال/اوایل دوره ی شیرواری	۴۰-۲۰ گرم به ازای هر رأس در روز
	اواسط دوره ی شیرواری	۳۰-۱۵ گرم به ازای هر رأس در روز
گاو گوشتی	۲۰-۵ گرم به ازای هر رأس در روز	
گوسفند و بز	۵-۳ گرم به ازای هر رأس در روز	
طیور	پیشگیری	۱-۰/۵ کیلوگرم در هر تن خوراک
	آلودگی کم تا متوسط به سموم	۲/۵-۱/۵ کیلوگرم در هر تن خوراک
	آلودگی شدید به سموم	۳ کیلوگرم در هر تن خوراک
آبزیان	۲/۵-۰/۵ کیلوگرم در هر تن خوراک	
اسب	کره اسب	۵ گرم به ازای هر رأس در روز
	مادیان، سیلمی و اسب مسابقه	۲۰-۱۵ گرم به ازای هر رأس در روز

راه‌های ارتباطی:

دفتر مشهد: ۰۵۱-۳۶۵۸۴۰۷۰
دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۹۹۵۷۴۱
دفتر آمل: ۰۱۱-۴۳۲۷۰۴۱۷

WWW.JAVANEHKHORASAN.COM
INFO@JAVANEHKHORASAN.COM
Javanehkhorasan.co