JAVANEH KHORASAN CO.
جوانه خراسان
ما برای شما بهترین‌ها را می‌خواهیم

بایندومکس® Pro

فراتر از یک جاذب

با مجوز رسمی از سازمان دامپزشکی کشور

"بایندومکس‌پرو" ترکیبی از اجزائی است که به دقت انتخاب شده اند تا حیوانات را از آثار مخرب سموم قارچی محافظت کند.

آلومینوسیلیکات ویژه
(جذب فیزیکی سموم قطبی)

اسیدهیومیک
(تسریع کننده و تقویت کننده سرعت جذب سطحی)

دیواره سلولی خالص سازی شده مخمر *ساکارومایسزسرویسیا*
(جذب فیزیکی سموم قطبی و غیرقطبی)





مقایسه غلظت آفلاتوکسین M1 شیر در گاوهای تغذیه شده با جاذب سموم قارچی وارداتی (توکسین بایندر وارداتی) در مقایسه با جاذب سموم قارچی شرکت جوانه خراسان (بایندومکس پرو)



مقایسه درصد جذب آفلاتوکسین ها در pH های مختلف توسط "بایندومکس"



	pH 3	pH 7	pH 9
AFB1	93.30	92.10	93.50
AFG1	85.70	87.50	90.50
AFB2	81.60	84.20	83.20
AFG2	67.10	68.70	72.40

JAVANEH KHORASAN CO.
We intend the bests for you

Bindomax Pro®

beyond an adsorbent

تأثیر افزودن سایر اجزای جاذب بر بهبود فرآیند جذب دیگر سموم، افزون بر آفلاتوکسین توسط "بایندومکس"



	پایه معدنی فعال	پایه معدنی فعال+اسیدهیومیک+دیواره سلولی مخمر
AFB 1	100	100
OTA	52.2	81.6
ZEN	23.6	73.5
DON	75.1	100

مقایسه رنگ کبد جوجه‌های گوشتی هنگام استفاده از سم آفلاتوکسین و توکسین بایندر "بایندومکس"**



جیره های آلوده به AF به همراه 1.5g/Kg توکسین بایندر "بایندومکس"

جیره‌های آلوده به AF به همراه 0.75g/Kg توکسین بایندر "بایندومکس"

جیره‌های آلوده به AF (۵۰۰ میکروگرم در کیلوگرم جیره)

جیره‌های غیرآلوده به AF

**تأثیر سطوح مختلف توکسین بایندر چند جزئی تجاری "بایندومکس" بر کاهش اثرات مخرب آفلاتوکسین در جوجه‌های گوشتی
"پنجمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی-۱۴۰۱"

ساز و کارهایی که "بایندومکس‌پرو" از طریق آن‌ها سبب کاهش آثار نامطلوب سموم قارچی می‌شود:

۱. جذب سموم قطبی (محلول در آب) و غیر قطبی
۲. کنترل و حمایت از عملکرد کبد و کلیه
۳. کاهش آسیب اکسیداتیو
۴. کاهش انتشار سیستماتیک توکسین‌ها

توصیه مصرف

گاو شیری	گوساله	۵ گرم به ازای هر رأس در روز		
	تلیسه	۱۰-۱۵ گرم به ازای هر رأس در روز		
	دوره‌ی انتقال/ اوایل دوره‌ی شیرواری	۲۰-۴۰ گرم به ازای هر رأس در روز		
	اواسط دوره‌ی شیرواری	۱۵-۳۰ گرم به ازای هر رأس در روز		
گاو گوشتی	۵-۲۰ گرم به ازای هر رأس در روز			
گوسفند و بز	۳-۵ گرم به ازای هر رأس در روز			
طیور	پیشگیری	۰/۵-۱ کیلوگرم در هر تن خوراک		
	آلودگی کم تا متوسط به سموم	۱/۵-۲/۵ کیلوگرم در هر تن خوراک		
	آلودگی شدید به سموم	۳ کیلوگرم در هر تن خوراک		
آبزیان	۰/۵-۲/۵ کیلوگرم در هر تن خوراک			
اسب	کره اسب	۵ گرم به ازای هر رأس در روز		
	مادیان، سیلمی و اسب مسابقه	۱۵-۲۰ گرم به ازای هر رأس در روز		

راه های ارتباطی:
دفتر مشهد: ۰۵۱-۳۶۵۸۴۰۷۰
دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۹۹۵۷۴۱
دفتر آمل: ۰۱۱-۴۳۲۷۰۴۱۷
WWW.JAVANEHKHORASAN.COM
INFO@JAVANEHKHORASAN.COM
Javanehkhorasan.co

JAVANEH KHORASAN CO.

جوانه خراسان

ما برای شما بهترین‌ها را می‌خواهیم

بایندومکس Pro®

فراتر از یک جاذب

"بایندومکس" راهکاری جامع برای غیرفعال کردن سموم قارچی با 2 استراتژی

۱. استراتژی جذب (Adsorption) از طریق جاذب کانی رسی فرآوری شده شیمیایی با قابلیت جذب بالا برای سموم قطبی و از طریق دیواره سلولی مخمر Saccharomyces cervisiae و اسید هیومیک برای جذب سموم قطبی و غیر قطبی

۲. استراتژی تغییر شکل زیستی سموم (Biotransformation) از طریق آنزیم‌های استراز و اپوکسیداز با منشاء مخمر

بیشینه سطح قابل تحمل سموم قارچی در خوراک کامل برای حیوانات

گونه حیوان	سموم مختلف (ppb)					
	آفلاتوکسین B1 (AFB1)	داکسی نیوالنول (DON)	زیرالنون (ZEN)	فومونایسین (FUM B1, B2)	اکراتوکسین A (OTA)	T2 توکسین (T2)
طیور	۲۰	۵۰۰	۱۰۰	۵۰۰۰	۱۰۰	۵۰
نشخوارکنندگان	۱۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰	۵۰

آنالیز اشعه-X فلورسانس و فلزات سنگین بخش معدنی مورد استفاده در "بایندومکس"

آنالیز شیمیایی XRF	
SiO_2	61.19
Al_2O_3	10.84
Fe_2O_3	2.01
MgO	1.73
CaO	6.17
Na_2O	1.6
K_2O	1.59
LOI	13.9

فلزات سنگین (ppm)	نتیجه آزمون	حد مجاز
آرسنیک	1	Max 4
سرب	12.05	Max 30
کادمیوم	0	Max 2
جیوه	0.01	Max 0.05

تأثیر افزودن سایر اجزای جاذب بر بهبود فرآیند جذب دیگر سموم، افزون بر آفلاتوکسین توسط "بایندومکس"



	پایه معدنی فعال	پایه معدنی فعال+اسیدهیومیک+دیواره سلولی مخمر
AFB 1	100	100
OTA	52.2	81.6
ZEN	23.6	73.5
DON	75.1	100